

TD - Licence 3 MASS

Exercice 1 On considère un marché financier viable à deux états sur deux périodes. Un émetteur d'une option f offre un prix C . Étudier les gains et pertes de ce vendeur dans les trois cas de figure suivants

$$1) C = C^*(f), \quad 2) C > C^*(f), \quad \text{et} \quad 3) C < C^*(f)$$

Solution :

Lorsque $C = C^*(f)$, l'émetteur de l'option pourra honorer son contrat en utilisant le portefeuille de couverture calculé dans le cours.

Si l'émetteur d'une option f offre un prix

$$C > C^*(f)$$

il aura ainsi l'opportunité de gagner $(C - C^*(f))$ Euros. Pour cela, il lui suffira simplement d'utiliser la stratégie de couverture définie ci-dessus pour honorer son contrat ; puis il empochera, sans trop effort, la somme résiduelle!

Inversement, si l'émetteur de l'option f offre un prix

$$C < C^*(f) = \bar{V}_0(\Phi)$$

il s'expose à une perte certaine de $(C^*(f) - C)$ Euros (on rappelle que $C^*(f)$ correspond à la plus petite valeur d'acquisition permettant de couvrir l'option). ■

Exercice 2 On considère le modèle de marché réactualisé décrit par l'arbre des épreuves suivant :




FIG. 1 – Evolution des actifs réactualisés

On considère un droit conditionnel de fonction de paiement réactualisée

$$\forall i \in \{1, 2, 3, 4\} \quad \bar{f}(\omega^i) = f(\omega^i)/(1+r)^2 = g(\bar{S}_2^2(\omega^i)) = \bar{f}_i$$

1. Neutraliser ce modèle de marché financier. Autrement dit, déterminer l'unique probabilité \mathbb{P}^* sur $\Omega = \{\omega^i, i = 1, 2, 3, 4\}$ telle que

$$\forall k = 2, 1 \quad \mathbb{E}^*(\bar{S}_k^2 \mid \bar{S}_{k-1}^2) = \bar{S}_k^2$$

2. Déterminer un portefeuille de couverture permettant de couvrir l'option \bar{f} .
3. Vérifier que ce portefeuille de couverture permettra à l'émetteur de l'option d'honorer son contrat dans chaque jeu d'aléas.

Solution :

1. La probabilité à risque neutre \mathbb{P}^* est donnée par les formules suivantes

$$\begin{aligned} \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1} \mid \bar{S}_0^2 = s_0) &= 1 - \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2} \mid \bar{S}_0^2 = s_0) \\ &= \frac{\bar{s}_{1,2} - s_0}{\bar{s}_{1,2} - \bar{s}_{1,1}} = \frac{6 - 5}{6 - 3} = \frac{1}{3} \\ \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,1} \mid \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1}) &= 1 - \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,2} \mid \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1}) \\ &= \frac{\bar{s}_{2,2} - \bar{s}_{1,1}}{\bar{s}_{2,2} - \bar{s}_{2,1}} = \frac{7 - 3}{7 - 2} = \frac{4}{5} \\ \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,3} \mid \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2}) &= 1 - \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,4} \mid \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2}) \\ &= \frac{\bar{s}_{2,4} - \bar{s}_{1,2}}{\bar{s}_{2,4} - \bar{s}_{2,3}} = \frac{10 - 6}{10 - 4} = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Ces probabilités de transitions sont résumées dans le diagramme suivant




FIG. 2 – Transitions neutres

On en conclut que

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}^*(\omega^1) &= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,1}, \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1} | \bar{S}_0^2 = s_0) \\
&= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,1} | \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1}) \times \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1} | \bar{S}_0^2 = s_0) = \frac{1}{3} \times \frac{4}{5} \\
\mathbb{P}^*(\omega^2) &= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,2}, \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1} | \bar{S}_0^2 = s_0) \\
&= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,2} | \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1}) \times \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,1} | \bar{S}_0^2 = s_0) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \\
\mathbb{P}^*(\omega^3) &= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,3}, \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2} | \bar{S}_0^2 = s_0) \\
&= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,3} | \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2}) \times \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2} | \bar{S}_0^2 = s_0) = \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \\
\mathbb{P}^*(\omega^4) &= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,4}, \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2} | \bar{S}_0^2 = s_0) \\
&= \mathbb{P}^*(\bar{S}_2^2 = \bar{s}_{2,4} | \bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2}) \times \mathbb{P}^*(\bar{S}_1^2 = \bar{s}_{1,2} | \bar{S}_0^2 = s_0) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{3}
\end{aligned}$$

2. La couverture de l'option \bar{f} revient à trouver une stratégie (Φ_1^2, Φ_2^2) prévisible, et une condition initiale $\bar{V}_0(\Phi)$, pour lesquelles le portefeuille réactualisé

$$\bar{V}_k(\Phi) = \bar{V}_0(\Phi) + \sum_{i=1}^k \Phi_i^2 \Delta \bar{S}_i^2$$

atteint à l'échéance $k = 2$ cette valeur

$$\bar{V}_2(\Phi) = \bar{V}_0(\Phi) + \sum_{k=1}^2 \Phi_k^2 \Delta \bar{S}_k^2 = g(\bar{S}_2^2)$$

Sous la probabilité à risque neutre, le coût initial du portefeuille de couverture est donné par l'une des formules suivantes :

$$\begin{aligned}
\bar{V}_0(\Phi) &= g_0(s_0) \\
&= g_1(\bar{s}_{1,1}) \mathbb{P}^*(\{\omega^1, \omega^2\}) + g_1(\bar{s}_{1,2}) \mathbb{P}^*(\{\omega^3, \omega^4\}) \\
&= \sum_{i=1}^4 g(\bar{s}_{2,i}) \mathbb{P}^*(\omega^i)
\end{aligned}$$

où $(g_k)_{k=0,1,2}$ désignent les fonctions définies par les équations de récurrence inverse

$$\begin{aligned}
g_2(\bar{S}_2^2) &= g(\bar{S}_2^2) \\
g_1(\bar{S}_1^2) &= \mathbb{E}^*(g_2(\bar{S}_2^2) | \bar{S}_1^2) \left(= \mathbb{E}^*(g(\bar{S}_2^2) | \bar{S}_1^2) \right) \\
g_0(\bar{S}_0^2) &= \mathbb{E}^*(g_1(\bar{S}_1^2) | \bar{S}_0^2) \left(= \mathbb{E}^*(g(\bar{S}_2^2) | \bar{S}_0^2) = \mathbb{E}^*(g(\bar{S}_2^2)) \right)
\end{aligned}$$

Ces formules de récurrence inverse sont synthétisées dans le schéma suivant :




FIG. 3 –

Le portefeuille de couverture est aussi donné par

$$\begin{aligned} \Phi_1^2 &= \frac{g_1(\overline{s}_{1,2}) - g_1(\overline{s}_{1,1})}{\overline{s}_{1,2} - \overline{s}_{1,1}} \\ &= \frac{\left(\frac{2}{3}\overline{f}_3 + \frac{1}{3}\overline{f}_4\right) - \left(\frac{4}{5}\overline{f}_1 + \frac{1}{5}\overline{f}_2\right)}{6 - 3} = \frac{1}{3} \left[\frac{2\overline{f}_3 + \overline{f}_4}{3} - \frac{4\overline{f}_1 + \overline{f}_2}{5} \right] \end{aligned}$$

et

$$\Phi_2^2 = \frac{g_2(b_2) - g_2(a_2)}{b_2 - a_2} = \begin{cases} \frac{g(\overline{s}_{2,2}) - g(\overline{s}_{2,1})}{\overline{s}_{2,2} - \overline{s}_{2,1}} = \frac{\overline{f}_2 - \overline{f}_1}{7-2} = \frac{\overline{f}_2 - \overline{f}_1}{5} & \text{si } \overline{S}_1^2 = 3 (= \overline{s}_{1,1}) \\ \frac{g(\overline{s}_{2,4}) - g(\overline{s}_{2,3})}{\overline{s}_{2,4} - \overline{s}_{2,3}} = \frac{\overline{f}_4 - \overline{f}_3}{10-4} = \frac{\overline{f}_4 - \overline{f}_3}{6} & \text{si } \overline{S}_1^2 = 6 (= \overline{s}_{1,2}) \end{cases}$$

D'après les propriétés d'autofinancement, les aménagements des actifs non risqués (Φ_1^1, Φ_2^1) sont donnés par les formules

$$\begin{aligned} \Phi_1^1 &= \overline{V}_0(\Phi) - \Phi_1^2 \overline{S}_0^2 = g_0(s_0) - \Phi_1^2 s_0 \\ \Phi_2^1 &= \overline{V}_1(\Phi) - \Phi_2^2 \overline{S}_1^2 = g_0(s_0) + \Phi_1^2 [\overline{S}_1^2 - \overline{S}_0^2] - \Phi_2^2 \overline{S}_1^2 \end{aligned}$$

3. Nous avons

$$\begin{aligned} \overline{V}_2(\Phi) &= \overline{V}_0(\Phi) + \Phi_1^2 \Delta \overline{S}_1^2 + \Phi_2^2 \Delta \overline{S}_2^2 \\ &= g_0(s_0) + \frac{g_1(\overline{s}_{1,2}) - g_1(\overline{s}_{1,1})}{\overline{s}_{1,2} - \overline{s}_{1,1}} [\overline{S}_1^2 - s_0] + \frac{g_2(b_2) - g_2(a_2)}{b_2 - a_2} [\overline{S}_2^2 - \overline{S}_1^2] \end{aligned}$$

En décomposant cette expression sur les évènements $\{\bar{S}_1^2 = 3\}$, et $\{\bar{S}_1^2 = 6\}$, on obtient

$$\begin{aligned}\bar{V}_2(\Phi) &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) \\ &+ \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] \left([3-5] 1_{\bar{S}_1^2=3} + [6-5] 1_{\bar{S}_1^2=6} \right) \\ &+ \frac{\bar{f}_2 - \bar{f}_1}{5} 1_{\bar{S}_1^2=3} [\bar{S}_2^2 - 3] + \frac{\bar{f}_4 - \bar{f}_3}{6} 1_{\bar{S}_1^2=6} [\bar{S}_2^2 - 6]\end{aligned}$$

Par conséquent, nous avons

$$\begin{aligned}\bar{V}_2(\Phi)(\omega^1) &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) - \frac{2}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] \\ &+ \frac{\bar{f}_2 - \bar{f}_1}{5} [2-3] \\ &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) - \frac{2}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] - \frac{\bar{f}_2 - \bar{f}_1}{5} \\ &= \bar{f}_1 \left(\frac{4}{15} + \frac{8}{15} + \frac{3}{15} \right) + \bar{f}_2 \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{15} - \frac{3}{15} \right) + \bar{f}_3 \left(\frac{4}{9} - \frac{4}{9} \right) \\ &\quad + \bar{f}_4 \left(\frac{2}{9} - \frac{2}{9} \right) = \bar{f}_1\end{aligned}$$

De même, on obtient

$$\begin{aligned}\bar{V}_2(\Phi)(\omega^2) &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) - \frac{2}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] \\ &+ \frac{\bar{f}_2 - \bar{f}_1}{5} [7-3] \\ &= \bar{f}_1 \left(\frac{4}{15} + \frac{8}{15} - \frac{12}{15} \right) + \bar{f}_2 \left(\frac{1}{15} + \frac{2}{15} + \frac{12}{15} \right) + \bar{f}_3 \left(\frac{4}{9} - \frac{4}{9} \right) \\ &\quad + \bar{f}_4 \left(\frac{2}{9} - \frac{2}{9} \right) = \bar{f}_2\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}\bar{V}_2(\Phi)(\omega^3) &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) + \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] \\ &+ \frac{\bar{f}_4 - \bar{f}_3}{6} [4-6] \\ &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) + \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] - \frac{\bar{f}_4 - \bar{f}_3}{3} \\ &= \bar{f}_1 \left(\frac{4}{15} - \frac{4}{15} \right) + \bar{f}_2 \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{15} \right) + \bar{f}_3 \left(\frac{4}{9} + \frac{2}{9} + \frac{3}{9} \right) \\ &\quad + \bar{f}_4 \left(\frac{2}{9} + \frac{1}{9} - \frac{3}{9} \right) = \bar{f}_3\end{aligned}$$

et enfin

$$\begin{aligned}
\bar{V}_2(\Phi)(\omega^4) &= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) + \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] \\
&\quad + \frac{\bar{f}_4 - \bar{f}_3}{6} [10 - 6] \\
&= \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) + \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] + \frac{2}{3} (\bar{f}_4 - \bar{f}_3) \\
&= \bar{f}_1 \left(\frac{4}{15} - \frac{4}{15} \right) + \bar{f}_2 \left(\frac{1}{15} - \frac{1}{15} \right) + \bar{f}_3 \left(\frac{4}{9} + \frac{2}{9} - \frac{6}{9} \right) \\
&\quad + \bar{f}_4 \left(\frac{2}{9} + \frac{1}{9} + \frac{6}{9} \right) = \bar{f}_4
\end{aligned}$$

■

Exercice 3 : Nous avons, dans chaque jeu d'aléas :

$$\begin{aligned}
\bar{f}_1 &= \bar{f}(\omega^1) = (\bar{S}_2^2 - 9)_+ = (2 - 9)_+ = 0 \\
\bar{f}_2 &= \bar{f}(\omega^2) = (\bar{S}_2^2 - 9)_+ = (7 - 9)_+ = 0 \\
\bar{f}_3 &= \bar{f}(\omega^3) = (\bar{S}_2^2 - 9)_+ = (4 - 9)_+ = 0 \\
\bar{f}_4 &= \bar{f}(\omega^4) = (\bar{S}_2^2 - 9)_+ = (10 - 9)_+ = 1
\end{aligned}$$

En reprenant les formules obtenues dans l'exercice 2, on obtient le prix de l'option

$$\bar{V}_0(\Phi) = g_0(s_0) = \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4 \right) = \frac{2}{9}$$

et le portefeuille de couverture

$$\Phi_1^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] = \frac{1}{9} \quad \text{et} \quad \Phi_2^2 = \frac{1}{6} 1_{\bar{S}_1^2=6}$$

Les aménagements des actifs non risqués (Φ_1^1, Φ_2^1) sont donnés par les formules

$$\begin{aligned}
\Phi_1^1 &= \bar{V}_0(\Phi) - \Phi_1^2 \bar{S}_0^2 = \frac{2}{9} - \frac{5}{9} = -\frac{1}{3} \\
\Phi_2^1 &= \bar{V}_1(\Phi) - \Phi_2^2 \bar{S}_1^2 = \frac{2}{9} + \frac{1}{9} [\bar{S}_1^2 - 5] - 1_{\bar{S}_1^2=6} = -\frac{1}{3} + \frac{\bar{S}_1^2}{9} - 1_{\bar{S}_1^2=6}
\end{aligned}$$

■

Exercice 3 Dans le modèle de marché décrit dans l'exercice 2, un agent financier émet une option d'achat de fonction de paiement réactualisée

$$\bar{f} = (\bar{S}_2^2 - 9)_+$$

Déterminer le prix de cette option, et son portefeuille de couverture.

Exercice 4 Dans le modèle de marché décrit dans l'exercice 2, un agent financier émet une option de vente de fonction de paiement réactualisée

$$\bar{f} = \left(7 - \bar{S}_2^2\right)_+$$

Déterminer le prix de cette option, et son portefeuille de couverture.

Solution :

Nous avons, dans chaque jeu d'aléas :

$$\begin{aligned}\bar{f}_1 &= \bar{f}(\omega^1) = \left(7 - \bar{S}_2^2\right)_+ = (7 - 2)_+ = 5 \\ \bar{f}_2 &= \bar{f}(\omega^2) = \left(7 - \bar{S}_2^2\right)_+ = (7 - 7)_+ = 0 \\ \bar{f}_3 &= \bar{f}(\omega^3) = \left(7 - \bar{S}_2^2\right)_+ = (7 - 4)_+ = 3 \\ \bar{f}_4 &= \bar{f}(\omega^4) = \left(7 - \bar{S}_2^2\right)_+ = (7 - 10)_+ = 0\end{aligned}$$

En reprenant les formules obtenues dans l'exercice 2, on obtient le prix de l'option

$$\bar{V}_0(\Phi) = g_0(s_0) = \left(\frac{4}{15}\bar{f}_1 + \frac{1}{15}\bar{f}_2 + \frac{4}{9}\bar{f}_3 + \frac{2}{9}\bar{f}_4\right) = \frac{4}{15} \times 5 + \frac{4}{9} \times 3 = \frac{8}{3}$$

et le portefeuille de couverture

$$\Phi_1^2 = \frac{1}{3} \left[\frac{2\bar{f}_3 + \bar{f}_4}{3} - \frac{4\bar{f}_1 + \bar{f}_2}{5} \right] = \frac{1}{3} [2 - 4] = -\frac{2}{3}$$

et

$$\Phi_2^2 = -1_{\bar{S}_1^2=3} - \frac{1}{2} 1_{\bar{S}_1^2=6}$$

Les aménagements des actifs non risqués (Φ_1^1, Φ_2^1) sont donnés par les formules

$$\begin{aligned}\Phi_1^1 &= \bar{V}_0(\Phi) - \Phi_1^2 \bar{S}_0^2 = \frac{8}{3} + \frac{10}{3} = 6 \\ \Phi_2^1 &= \bar{V}_1(\Phi) - \Phi_2^2 \bar{S}_1^2 = \frac{8}{3} - \frac{2}{3} (\bar{S}_1^2 - 5) + \left(1_{\bar{S}_1^2=3} + \frac{1}{2} 1_{\bar{S}_1^2=6}\right) \bar{S}_1^2 \\ &= 6 - \frac{2}{3} \bar{S}_1^2 + 3 \left(2 \times 1_{\bar{S}_1^2=3} + 1_{\bar{S}_1^2=6}\right) \\ &= 6 + 4 \times 1_{\bar{S}_1^2=3} - 1_{\bar{S}_1^2=6} = 10 \times 1_{\bar{S}_1^2=3} - 5 \times 1_{\bar{S}_1^2=6}\end{aligned}$$

■